

# Formler till nationellt prov i matematik, kurs 4

## Algebra

<b>Regler</b>	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
	$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
		$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

**Andragradsekvationer**  $x^2 + px + q = 0$   $ax^2 + bx + c = 0$

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## Aritmetik

Prefix	T	G	M	k	h	d	c	m	$\mu$	n	p
	tera	giga	mega	kilo	hekt	deci	centi	milli	mikro	nano	piko
	$10^{12}$	$10^9$	$10^6$	$10^3$	$10^2$	$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$	$10^{-6}$	$10^{-9}$	$10^{-12}$

**Potenser**  $a^x a^y = a^{x+y}$   $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$   $(a^x)^y = a^{xy}$   $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$

$$a^x b^x = (ab)^x$$

$$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^0 = 1$$

**Geometrisk summa**  $a + ak + ak^2 + \dots + ak^{n-1} = \frac{a(k^n - 1)}{k - 1}$  där  $k \neq 1$

**Logaritmer**  $y = 10^x \Leftrightarrow x = \lg y$   $y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$

$$\lg x + \lg y = \lg xy$$

$$\lg x - \lg y = \lg \frac{x}{y}$$

$$\lg x^p = p \cdot \lg x$$

**Absolutbelopp**  $|a| = \begin{cases} a & \text{om } a \geq 0 \\ -a & \text{om } a < 0 \end{cases}$

## Funktioner

### Räta linjen

$$y = kx + m \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$ax + by + c = 0$ , där inte både  $a$  och  $b$  är noll

### Potensfunktioner

$$y = C \cdot x^a$$

### Andragradsfunktioner

$$y = ax^2 + bx + c \quad a \neq 0$$

### Exponentialfunktioner


$$y = C \cdot a^x \quad a > 0 \text{ och } a \neq 1$$

## Statistik och sannolikhet


### Standardavvikelse för ett stickprov

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

### Lådagram



### Normalfördelning



### Täthetsfunktion för normalfördelning

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

## Differential- och integralkalkyl

**Derivatans definition**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

Derivator	Funktion	Derivata
	$x^n$ där $n$ är ett reellt tal	$nx^{n-1}$
	$a^x$ ( $a > 0$ )	$a^x \ln a$
	$\ln x$ ( $x > 0$ )	$\frac{1}{x}$
	$e^x$	$e^x$
	$e^{kx}$	$k \cdot e^{kx}$
	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
	$k \cdot f(x)$	$k \cdot f'(x)$
	$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$
	$f(x) \cdot g(x)$	$f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x)$
	$\frac{f(x)}{g(x)}$ ( $g(x) \neq 0$ )	$\frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$

### Kedjeregeln

Om  $y = f(z)$  och  $z = g(x)$  är två deriverbara funktioner så gäller för  $y = f(g(x))$  att

$$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \text{ eller } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

**Primitiva funktioner**

Funktion	Primitiva funktioner
$k$	$kx + C$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C \quad (x > 0)$
$e^x$	$e^x + C$
$e^{kx}$	$\frac{e^{kx}}{k} + C$
$a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$

**Komplexa tal****Representation**

$$z = x + iy = r e^{iv} = r(\cos v + i \sin v) \text{ där } i^2 = -1$$

**Argument**

$$\arg z = v \quad \tan v = \frac{y}{x}$$

**Absolutbelopp**

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

**Konjugat**

$$\text{Om } z = x + iy \text{ så } \bar{z} = x - iy$$

**Räknelagar**

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(v_1 + v_2) + i \sin(v_1 + v_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(v_1 - v_2) + i \sin(v_1 - v_2))$$


**de Moivres formel**

$$z^n = (r(\cos v + i \sin v))^n = r^n (\cos nv + i \sin nv)$$

## Geometri


### Triangel

$$A = \frac{bh}{2}$$




### Parallelogram

$$A = bh$$




### Paralleltrapets

$$A = \frac{h(a+b)}{2}$$



### Cirkel


$$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$



### Cirkelsektor


$$b = \frac{v}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

$$A = \frac{v}{360^\circ} \cdot \pi r^2 = \frac{br}{2}$$



### Prisma

$$V = Bh$$




### Cylinder

$$V = \pi r^2 h$$


Mantelarea

$$A = 2\pi rh$$



### Pyramid

$$V = \frac{Bh}{3}$$




### Kon

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Mantelarea


$$A = \pi rs$$



### Klot

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$


$$A = 4\pi r^2$$



### Likformighet

Trianglarna  $ABC$  och  $DEF$  är likformiga.

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$$




### Skala

Areaskalan =  $(\text{Längdskalan})^2$   
Volymskalan =  $(\text{Längdskalan})^3$

### Topptriangel- och transversalsatsen

Om  $DE$  är parallell med  $AB$  gäller


$$\frac{DE}{AB} = \frac{CD}{AC} = \frac{CE}{BC} \text{ och}$$



$$\frac{CD}{AD} = \frac{CE}{BE}$$


### Bisektrissatsen

$$\frac{AD}{BD} = \frac{AC}{BC}$$




### Vinklar

$$u + v = 180^\circ \quad \text{Sidovinklar}$$



$$w = v \quad \text{Vertikalvinklar}$$




$L_1$  skär två parallella linjer  $L_2$  och  $L_3$

$$v = w \quad \text{Likbelägna vinklar}$$

$$u = w \quad \text{Alternativvinklar}$$


### Kordasatsen

$$ab = cd$$




### Randvinkelsatsen

$$u = 2v$$



### Pythagoras sats

$$a^2 + b^2 = c^2$$



### Avståndsformeln

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

### Mittpunktsformeln

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2} \text{ och } y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$$


# Trigonometri

## Definitioner

$$\sin v = \frac{a}{c}$$

$$\cos v = \frac{b}{c}$$

$$\tan v = \frac{a}{b}$$




## Enhetscirkeln

$$\sin v = y$$

$$\cos v = x$$

$$\tan v = \frac{y}{x}$$



## Sinussatsen


$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

## Cosinussatsen

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

## Areasatsen

$$T = \frac{ab \sin C}{2}$$



## Trigonometriska formler

$$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$$

$$\sin(v+u) = \sin v \cos u + \cos v \sin u$$

$$\sin(v-u) = \sin v \cos u - \cos v \sin u$$

$$\cos(v+u) = \cos v \cos u - \sin v \sin u$$

$$\cos(v-u) = \cos v \cos u + \sin v \sin u$$

$$\sin 2v = 2 \sin v \cos v$$

$$\cos 2v = \begin{cases} \cos^2 v - \sin^2 v & (1) \\ 2\cos^2 v - 1 & (2) \\ 1 - 2\sin^2 v & (3) \end{cases}$$

$$a \sin x + b \cos x = c \sin(x+v) \text{ där } c = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ och } \tan v = \frac{b}{a}$$

## Cirkelns ekvation

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

**Exakta  
värden**

Vinkel $v$ (grader) (radianer)	$0^\circ$ 0	$30^\circ$ $\frac{\pi}{6}$	$45^\circ$ $\frac{\pi}{4}$	$60^\circ$ $\frac{\pi}{3}$	$90^\circ$ $\frac{\pi}{2}$	$120^\circ$ $\frac{2\pi}{3}$	$135^\circ$ $\frac{3\pi}{4}$	$150^\circ$ $\frac{5\pi}{6}$	$180^\circ$ $\pi$
$\sin v$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos v$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan v$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	Ej def.	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0